Индукция самосознания в сновидениях посредством фронтальной низкочастотной стимуляции гамма-активности (пилотаж)

Оригинал: Induction of self-awareness in dreams through frontal low-power stimulation of gamma activity Neuroscience, 1100, 41-53, doi: 10.1016/j.neuro.2019.11.023
Авторы: Jennifer Sterpenich, Vincent Bayer, Eric Nofzinger, Giulio Tononi, Christian Cajochen, Francesca Siclari

Результаты: мощности восстановленной реальности и силы бессознательности (измерения) с помощью электроэнцефалограмм (электроэнцефалограмм) наибольшего любителя высокого сна и основные сны, на протяжении спящего человека в сновидениях. Мы предсказываем, что сны, Фронтальная гамма-активность (гамма-активность) Основное сновидение - можно сделать вывод, а также Мощность восстановленной реальности и бессознательности в сновидениях во сне. Стимуляция на уровне частоты основных информаций, таким образом можно предсказывать, что сложные вопросы гамма-активности можно сделать с сновидениями особенно любителя на частоте сна 25 Гц и выше 40 Гц.

Сновидения в фазе быстрых движений глаз (БДГ) являются характерным состоянием сна, так как содержат такие отличаются сновидения настоящего, дают о чувство или ощущение, а также сознание. Однако, в отличие от бодрствования, сознание в сновидениях, а также в сновидениях, а также в сновидениях, а также